



Três Barras do Paraná
Administração Municipal



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

VERSÃO 3 - OUTUBRO 2021



SUMARIO

1- INTRODUÇÃO	2
2- PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL VACINAÇÃO COVID-19	3
2.1 IDENTIFICAÇÃO	3
2.2 FARMACOVIGILÂNCIA	4
2.3 OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO	4
2.4 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	6
2.5 GRUPOS PRIORITÁRIOS.....	6
2.6 COMUNICAÇÃO	7
2.7 ESCALONAMENTO VACINAL MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS -COVID 19.....	9
2.8 LISTA DOS VACINADOS	11
3- SEGURANÇA CLÍNICA, EFICÁCIA, POTENCIAS RISCOS E BENEFÍCIOS DAS VACINAS CORONAVAC E (BULAS DOS FABRICANTES).....	12
4- INSUMOS RECEBIDOS E ADQUIRIDOS PARA VACINAÇÃO COVID-19	21
5- DISQUE DENUNCIA (IRREGULARIDADES E “FURA FILA”)	22
6- SALAS DE VACINAÇÃO	22
7- REGISTRO DE SOBRA IDENTIFICADA DE DOSES DA VACINA.....	23



1- INTRODUÇÃO

O presente documento fornece informações pertinentes e relacionados a pandemia pelo novo coronavírus (covid-19), como: grupos prioritários para vacinação, locais de vacinação com população estimada para vacinação, insumos comprados e/ou recebidos de outras esferas do governo ou doações, como também as bulas com esclarecimentos ao paciente das vacinas **CoronaVac** (Butantan), **Astra Zeneca** (Oxford), Vacina da **Janssen COVID-19** (Johnson & Johnson) e **Cominarty covid-19**(Pfizer), dentre outras.

As vacinas CoronaVac, Astra Zeneca e Pfizer serão administradas em duas doses, já a vacina Janssen é dose única. A dose de reforço Pfizer (3ª Dose) será administrada neste momento somente em pacientes que já tomaram as duas doses da CoronaVac, 6 meses após a 2ª dose.



2- PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL VACINAÇÃO COVID-19

2.1 IDENTIFICAÇÃO			
Município: Três Barras do Paraná		Regional de Saúde: 10ª RS	
Endereço da SMS: Avenida São Paulo, 451			
Função	Contato		
	Nome	Telefone	E-mail
Secretária Municipal de Saúde	Débora Nádia Pilati Vidor	(45)991434994	sms@tresbarras.pr.gov.br
Responsável Vigilância Epidemiológica	Delina Gomes da Silva Oenning	(45)991341437	epidemiologia@tresbarras.pr.gov.br
Responsável Vigilância Sanitária	Izabete da Silva Derzbacher	(45)991272311	visamunicipal3b@yahoo.com.br
Responsável Atenção Primária	Delina Gomes da Silva Oenning	(45)991341437	delinaoenning@hotmail.com



Coordenador/a Imunização	Odete Pallauro	(45)991393969	vacinas@tresbarras.pr.gov.br
-----------------------------	----------------	---------------	------------------------------

2.2 FARMACOVIGILÂNCIA

Ações	Atividades
Notificação de EAPV	A notificação será realizada na sala de vacinas; Será realizado através do Sistema E-SUS e formulário impresso disponibilizado pela Regional de saúde. Os responsáveis para inclusão no sistema de informação E-SUS notifica serão Edisandra, Odete e Gabriel;
Investigação de EAPV	O responsável pela investigação será o Enfermeiro que estiver atendendo na sala da ESF; O Enfermeiro irá acolher a queixa do paciente e avaliar as possíveis reações e a gravidade das mesmas; Caso leve: orientação; Caso moderado: orientação, avaliação médica e acompanhamento/monitoramento pela ESF de abrangência; Caso grave: Encaminhar a unidade de referência (Hospital Municipal e SAMU);
Identificação de Eventos Graves Pós-Vacinação, conforme Portaria n.º 204, de 17 de fevereiro de 2016	Responsável em informar a Regional de Saúde em 24 horas Enfermeira da Vigilância Epidemiológica (Delina); A notificação será repassada a Regional de Saúde primeiramente através de telefone e posteriormente encaminhada planilha via e-mail; A referência do município para atendimento ao usuário é o Hospital Municipal e SAMU;

2.3 OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO



Ações	Atividades
Organização da Rede de Frio	O recebimento das vacinas será em caixa exclusiva, ambientada com termômetro. Armazenamento em câmara fria na sala de vacina com controle de temperatura registradas em planilhas 2 vezes ao dia;
Capacitação/atualização dos profissionais de saúde	<p>Capacitação/atualização semanal ou de acordo com a necessidade orientação da 10ªRS e PNI.</p> <p>Os profissionais que atuam na sala de vacina e o responsável para alimentação do sistema foram capacitados através da web conferência realizada pela Regional de Saúde de acordo com o plano estadual de vacinação.</p> <p>A capacitação para os demais profissionais que atuam na campanha pela equipe da sala de vacina e Vigilância Epidemiológica;</p> <p>O uso de EPI's será conforme disponibilizado pelo Ministério da Saúde e o uso de acordo protocolo da unidade;</p>
Vacinação -Sala Senac (Prefeitura) -Sala de Vacina	<p>O escalonamento da vacinação dos profissionais de saúde e demais, seguirá conforme anexo II do Plano Estadual de Vacinação do Covid 19 (SESA-PR) (anexo 1).</p> <p>Os demais grupos prioritários seguirão ordem descrita no item 2.5.</p> <p>O funcionamento da sala de vacina segue com atendimento normal, com ampliação da força de trabalho para atendimento da demanda gerada pela vacinação do covid19. A vacinação da população ocorre na Sala do Senac (Prefeitura Municipal) com distribuição de senhas aos usuários para organização do fluxo.</p> <p>Se houver necessidade, o horário poderá ser estendido até as 19:00 hs e também aos sábados.</p>



2.4 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Ações	Atividades
Operacionalização do Sistema de Informação	Os operadores da sala de vacina serão responsáveis pela digitação dos dados dos vacinados conforme atendimento. A sala de vacina esta informatizada com acesso à internet que permite a digitação online. Os mesmos foram capacitados através da web conferência realizada pela Regional de Saúde de acordo com o plano estadual de vacinação.
Vacinação Extra Muro	A vacinação extra muro será somente para os funcionários do Hospital Municipal e Laboratórios que atuam na linha de frente, com o registro manual e posteriormente digitado no Sistema. Planilha destacada no item 2.8.
Registro na Caderneta de Vacinação	É de responsabilidade dos operadores o preenchimento da Caderneta de Vacinação contendo os dados de identificação pessoal e dados do registro de aplicação. Contando com o apoio dos Agentes Comunitários de Saúde(ACS).

2.5 GRUPOS PRIORITÁRIOS

Serão vacinados seguindo orientações da SESA/PR

Grupos Prioritários	Quantitativo
Trabalhadores de Serviços de Saúde públicos e privados	226
Pessoas de 80 anos ou mais	235
Pessoas de 75 a 79 anos	263
Pessoas de 70 a 74 anos	384
Pessoas de 65 a 69 anos	479



Pessoas de 60 a 64 anos	576
Pessoas de 50 a 59 anos	1.152
Pessoas de 40 a 49 anos	1.575
Pessoas de 30 a 39 anos	1.790
Pessoas de 20 a 29 anos	1.908
Pessoas de 12 a 19 anos	1.872
Comorbidades	984
Trabalhadores Educação e da Assist. Social (CRAS, CREAS, Casas/Unid. de Acolhimento)	172
Pessoas com Deficiência Institucionalizadas	32
Pessoas com Deficiência Permanente Severa	3
Caminhoneiros	46
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de Passageiros	7
Gestantes e puérperas	147
TOTAL	9.944
Total de doses aplicadas	12.405 doses

Fonte: ipardes.pr.gov.br/Pagina/Projeção-da-população-dos-Municípios-do-Parana-2018-2040: Acesso para levantamento de estimativa populacional Três Barras do Paraná 2021 em 01/07/2021 as 10:00 hs.

2.6 COMUNICAÇÃO

Ações	Atividades
-------	------------



Comunicação	Divulgação através da mídia tais como rádio, redes sociais/ WhatsApp e site oficial da prefeitura municipal.
-------------	--



2.7 ESCALONAMENTO VACINAL MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS -COVID 19

ANEXO II

Escalonamento da vacinação em Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde, visando execução do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 do Paraná

I- INTRODUÇÃO

Considerando a população a ser vacinada e o quantitativo de vacinas disponíveis, os conceitos e escalonamento, abaixo apresentados, visam a subsidiar a execução do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19.

Este conteúdo será atualizado sempre que houver modificações nas variáveis ora consideradas e de acordo com mudanças no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19, do Programa Nacional de Imunizações – PNI, do Ministério da Saúde.

II- TRABALHADOR DE SERVIÇO DE SAÚDE

Pessoa que exerce as atividades laborais em serviço de saúde (instituições públicas e privadas prestadoras de serviços de internação hospitalar e instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde).

Os locais de trabalho são de natureza diversa, desde onde se realiza a assistência direta ao usuário acamado, até ambientes cujas atividades desenvolvidas são, exclusivamente, administrativas.

Deste modo, ainda que se enquadre como trabalhador de serviço de saúde, a exposição ao risco é diversa nos diferentes ambientes de trabalho.

A priorização da vacinação contra a COVID-19 no grupo prioritário de **Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde** será em conformidade com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19 (PNI/MS, 2021, 2ª Edição), e escalonada por local de atividade.

Todos os trabalhadores de saúde serão vacinados, porém, a ordem de prioridade temporal para a vacinação está escalonada em subgrupos, conforme apresentado abaixo.

III- ESCALONAMENTO DA VACINAÇÃO EM TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICOS E PRIVADOS

A execução do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 no Paraná se dará em etapas (1 a 10) correspondentes aos subgrupos de trabalhadores de saúde (ordem operacional e cronológica).

Exemplificando, ao término da vacinação dos trabalhadores do subgrupo 1, inicia-se a vacinação para os trabalhadores pertencentes ao subgrupo 2 e assim, sucessivamente.



SUBGRUPOS DE TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE

- 1. Trabalhadores vacinadores/aplicadores da vacina contra a COVID-19.**
- 2. Trabalhadores de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).**
- 3. Trabalhadores de hospitais e serviços de urgência e emergência (UPA, SAMU, SIATE), de referência* COVID-19, Clínicas de Diálise, Serviços de Oncologia:**
 - 3.1 Trabalhadores que atuam na assistência direta a paciente COVID-19;
 - 3.2 Trabalhadores de apoio/suporte ao paciente e à equipe que atende COVID-19 (motorista, laboratório, imagem, limpeza, nutrição, entre outros);
 - 3.3 Trabalhadores que atuam em Clínicas de Diálise e Serviços de Oncologia, devido ao risco de transmissão do vírus aos pacientes;
 - 3.4 Trabalhadores em geral, exceto de áreas administrativas.

* Serviço de saúde que presta atendimento à paciente COVID-19.
- 4. Trabalhadores de Centros de Atendimento à COVID-19.**
- 5. Trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS) e de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).**
- 6. Trabalhadores de laboratórios que coletam ambulatorialmente e processam testes/exames laboratoriais para a COVID-19.**
- 7. Trabalhadores dos demais serviços de Urgência e Emergência, como os Pronto Atendimento (PA) que não são referência para COVID-19 e de hemocentros.**
- 8. Trabalhadores que atuam na Vigilância em Saúde que desenvolvem atividades de campo relacionadas à COVID-19.**
- 9. Trabalhadores dos demais serviços ambulatoriais e hospitalares, trabalhadores atuantes em farmácias, em sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados (COVID-19), cuidadores domiciliares, doulas, e trabalhadores atuantes em áreas administrativas, inclusive da gerência e gestão da saúde.**
- 10. Trabalhadores de serviços ambulatoriais e hospitalares, públicos e privados, que se encontram em teletrabalho devido pandemia, e demais não listados anteriormente.**

Atualizado em 26.01.2021.



3- SEGURANÇA CLÍNICA, EFICÁCIA, POTENCIAIS RISCOS E BENEFÍCIOS DAS VACINAS CORONAVAC E (BULAS DOS FABRICANTES)

a) **CORONAVAC (Butantan/ Sinovac)**: Desenvolvida pela farmacêutica chinesa **Sinovac**, é produzida no Brasil pelo **Instituto Butantan**. Indicada para imunização ativa para prevenir casos de COVID-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, em indivíduos com 18 anos ou mais que sejam suscetíveis ao vírus.



DIZERES DE TEXTO DE BULA – INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- INDICAÇÃO E PROTEÇÃO

A vacina adsorvida covid-19 (inativada) é indicada para imunização ativa para prevenir casos de COVID-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, em indivíduos com 18 anos ou mais que sejam suscetíveis ao vírus.

O esquema vacinal completo com duas doses é necessário para obter a resposta imune esperada para a prevenção de COVID-19. A proteção em indivíduos com esquemas incompletos não foi avaliada nos estudos clínicos.

Não há estudos que demonstrem proteção da vacina adsorvida covid-19 (inativada) contra a infecção por SARS-CoV-2, uma vez que o objetivo dos estudos realizados até o momento foi o de avaliar a eficácia para a proteção contra a doença causada pelo SARS-CoV-2. Portanto, as pessoas que receberem o esquema de imunização deverão manter as medidas de prevenção contra infecção por SARS-CoV-2 para diminuir o risco de infecção e transmissão do SARS-CoV-2 a contactantes. Em particular, profissionais de saúde, devem manter a utilização das medidas de biossegurança para evitar a infecção e transmissão do SARS-CoV-2.

-QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Reações adversas observadas a partir de estudos clínicos fase I/II em Adultos (18-59 anos) e Idosos (com mais de 60 anos):



- **Reação muito comum** (podem ocorrer em mais de 10% dos pacientes), local da aplicação (dor);
- **Reação comum** (podem ocorrer entre 1% e 10% dos pacientes), sistêmica: cansaço, febre, dor no corpo, diarreia, náusea, dor de cabeça;
- **Reação incomum** (podem ocorrer entre 0,1% e 1% dos pacientes), sistêmica: vômitos, dor abdominal inferior, distensão abdominal, tonturas, tosse, perda de apetite, reação alérgica, pressão arterial elevada, hipersensibilidade alérgica ou imediata e no Local da aplicação: coloração anormal, inchaço, coceira, vermelhidão, diminuição da sensibilidade, endurecimento;

Reações adversas observadas a partir do estudo clínico fase III em Adultos (18-59 anos) até 7 dias após a administração da segunda dose da vacina:

- **Reação muito comum** (podem ocorrer em mais de 10% dos pacientes) o Sistêmica: dor de cabeça, cansaço e dor Local.
- **Reação comum** (podem ocorrer entre 1% e 10% dos pacientes) o Sistêmica: enjojo, diarreia, dor muscular, calafrios, perda de apetite, tosse, dor nas articulações, coceira, coriza, congestão nasal e Local: vermelhidão, inchaço, endureção, coceira;
- **Reação incomum** (podem ocorrer entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento) e Sistêmica: vômito, febre, vermelhidão, reação alérgica, dor garganta, dor ao engolir, espirros, fraqueza muscular, tontura, dor abdominal, sonolência, mal estar, dor nas extremidades, dor abdominal superior, dor nas costas, vertigem, falta de ar, inchaço e Local: hematoma;

Reações adversas observadas a partir do estudo clínico fase III em Idosos (acima de 60 anos) até 7 dias após a administração da segunda dose da vacina: - **Reação muito comum** (podem ocorrer em mais de 10% dos pacientes) no Local: dor;

- **Reação comum** (podem ocorrer entre 1% e 10% dos pacientes) e Sistêmica: enjojo, diarreia, dor de cabeça, cansaço, dor muscular, tosse, dor nas articulações, coceira, coriza, dor ao engolir, congestão nasal e Local: coceira, vermelhidão, inchaço, endureção;
- **Reação incomum** (podem ocorrer entre 0,1% e 1% dos pacientes) Sistêmica: vômito, calafrios, diminuição de apetite, reação alérgica, tontura, hematoma, hipotermia, desconforto nos membros, fraqueza muscular e Local: hematoma




Além disso, existem riscos teóricos de que indivíduos vacinados poderiam desenvolver Doença Agravada pela Vacina, ou seja, ter uma doença mais grave do que teria caso não tivesse tomado a vacina, mas até o momento não há relato que isso tenha acontecido com o vírus que causa a COVID-19. Esta vacina foi testada anteriormente em animais e estes não apresentaram esta forma de infecção mais grave. Em caso de evento adverso, mesmo que não seja os informados acima, contate o serviço de atendimento ao consumidor da empresa.

Atenção: este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos.

Bibliografia: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/_bulas-saiba-mais-sobre-as-vacinas-autorizadas-para-uso-emergencial/bula-vacina-covid-19-recombinante_vp_001_21-01-2021.pdf. Acesso em 15.03.2021 as 14:00 horas.

b) COVIDSHIELD (AstraZeneca/ Oxford/ Fio Cruz): Mais conhecida como vacina de Oxford, resultado da união de recursos e esforços entre a universidade inglesa e a farmacêutica AstraZeneca, que será produzida no Brasil pela **Fundação Oswaldo Cruz** (Fiocruz).



DIZERES DE TEXTO DE BULA – INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- BULA VACINA INDICAÇÃO E PROTEÇÃO

Vacina covid-19 (recombinante) é indicada para a imunização ativa de indivíduos a partir de 18 anos de idade para a prevenção da doença do coronavírus 2019 (COVID-19). A vacina covid-19 (recombinante) estimula as defesas naturais do corpo (sistema imune).



Isso faz com que o corpo produza sua própria proteção (anticorpos) contra o vírus causador da COVID-19, o SARS-CoV-2. Isso ajudará a proteger você contra a COVID-19 no futuro. Nenhum dos ingredientes dessa vacina pode causar a COVID-19. Como com qualquer vacina, a vacina covid-19 (recombinante) pode não proteger todo mundo que é vacinado contra a COVID-19. Ainda não se sabe por quanto tempo as pessoas que recebem a vacina estarão protegidas.

-QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Como todos os medicamentos, essa vacina pode causar efeitos colaterais, apesar de nem todas as pessoas os apresentarem. Em estudos clínicos com a vacina, a maioria dos efeitos colaterais foi de natureza leve a moderada e resolvida dentro de poucos dias, com alguns ainda presentes uma semana após a vacinação. Se efeitos colaterais como dor e/ou febre estiverem incomodando, informe o seu profissional de saúde, ele poderá indicar o uso de algum medicamento para alívio destes sintomas, como por exemplo medicamentos contendo paracetamol.

Os efeitos colaterais que ocorreram durante os estudos clínicos com a vacina covid-19 (recombinante) foram:

Muito Comum (pode afetar mais de 1 em cada 10 pessoas) •Sensibilidade, dor, sensação de calor, vermelhidão, coceira, inchaço ou hematoma (manchas roxas) onde a injeção é administrada •Sensação de indisposição de forma geral •Sensação de cansaço (fadiga) •Calafrio ou sensação febril •Dor de cabeça •Enjoos (náusea) •Dor nas articulação ou dor muscular;

Comum (pode afetar até 1 em cada 10 pessoas) •Um caroço no local da injeção •Febre •Enjoos (vômitos) •Sintomas semelhantes aos de um resfriado como febre alta, dor de garganta, coriza (nariz escorrendo), tosse e calafrios;

Incomum (pode afetar até 1 em cada 100 pessoas) •Sensação de tontura •Diminuição do apetite •Dor abdominal •Linfonodos (ínguas) aumentados •Sudorese excessiva, coceira na pele ou erupção na pele.

Em ensaios clínicos, foram notificados casos muito raros de eventos associados a inflamação do sistema nervoso, que podem causar dormência, sensação de formigamento e/ ou perda de sensibilidade. No entanto, não está confirmado se esses eventos foram devido à vacina.



Bibliografia: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/bulas-saiba-mais-sobre-as-vacinas-autorizadas-para-uso-emergencial/bula-vacina-covid-19-recombinante_vp_001_21-01-2021.pdf. Acesso em 15.03.2021 as 15:00 horas.

c) COMIRNATY™ (Pfizer): Conhecida como vacina da Pfizer, é uma vacina para prevenir a doença COVID-19 provocada pelo vírus SARS-CoV-2 em indivíduos com idade igual ou superior a 16 anos. A dose de reforço Pfizer (3ª Dose) será administrada somente em pacientes que já tomaram as duas doses da CoronaVac, e após 6 meses da 2ª dose.

Wyeth

Comirnaty™
vacina covid-19

DIZERES DE TEXTO DE BULA – INFORMAÇÕES AO PACIENTE

-PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Comirnaty™ é uma vacina para prevenir a doença COVID-19 provocada pelo vírus SARS-CoV-2 em indivíduos com idade igual ou superior a 16 anos.

-COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A vacina faz com que o sistema imune (as defesas naturais do organismo) produza anticorpos e células de defesa que atuam contra o vírus SARS-CoV-2, possibilitando assim a proteção contra a doença COVID-19. Uma vez que a Comirnaty™ possui apenas uma parte sintética do material genético do vírus, e não o vírus em si, ela não provoca a doença COVID-19 em quem a recebe.

-QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Comirnaty™ não deve ser administrada em pessoas que tenham apresentado reação alérgica (hipersensibilidade) aos componentes dessa vacina. Os componentes de Comirnaty™ estão listados no item “Composição” desta bula.



-O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Converse com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de ser administrada a vacina se você:

- alguma vez teve uma reação alérgica grave ou problemas respiratórios após qualquer outra injeção de vacina ou após você ter recebido Comirnaty™ no passado.
- está se sentindo nervoso com o processo de vacinação ou já desmaiou após qualquer aplicação de injeção.
- se nesse momento está com doença aguda, ou infecção com febre alta. No entanto, você pode ser vacinado se estiver apresentando febre baixa ou quadro leve de infecção.
- se tiver problemas de hemorragia ou coagulação, machuca-se com facilidade ou utilizar um medicamento para prevenir a formação de coágulos sanguíneos, ou qualquer tratamento para afinar o sangue.
- tem um sistema imunológico enfraquecido, ou é um imunossuprimido, seja por uma doença ou por estar fazendo uso de algum medicamento para o tratamento de alguma doença.
- está grávida ou amamentando.

Assim como acontece com qualquer vacina, o esquema de vacinação de 2 doses de Comirnaty™ pode não proteger totalmente todos os indivíduos que a recebem. Não se sabe quanto tempo dura a proteção gerada pela vacina em quem a recebe.

Crianças e adolescentes: Não se recomenda a sua utilização em crianças com idade inferior a 16 anos.

Interações medicamentosas: Essa vacina não foi avaliada para uso concomitante, ou seja, no mesmo dia ou junto com outra vacina.

Gravidez e amamentação: Se você está grávida ou amamentando, acredita que pode estar grávida ou está planejando ter um bebê, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de receber esta vacina. Esta vacina não deve ser usada por mulheres grávidas, ou que estejam amamentando, sem orientação médica. Dirigir veículos e utilizar máquinas
Alguns dos efeitos da vacinação mencionados na questão.



-QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Podem afetar temporariamente a sua capacidade de dirigir ou utilizar máquinas. Aguarde até que estes efeitos tenham desaparecido antes de dirigir ou utilizar máquinas.

Bibliografia: https://www.pfizer.com.br/sites/default/files/inline-files/Comirnaty_Paciente10.pdf. Acesso em 06/07/2021 às 15:00 hs.

d) VACINA JANSSEN COVID-19 (Janssen/ Johnson & Johnson): Conhecida como vacina da Janssen, é administrada em dose única, por via intramuscular. A FDA autorizou o uso emergencial da Vacina Janssen COVID-19 em indivíduos maiores de 18 anos.



DIZERES DE TEXTO DE BULA – INFORMAÇÕES AO PACIENTE

-PARA QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

Vacina covid-19 (recombinante) é indicada para:

- para imunização ativa para prevenir a COVID-19 causada por SARS-CoV-2 em indivíduos com 18 anos de idade ou mais. O uso desta vacina deve estar de acordo com as recomendações oficiais.

-COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A vacina faz com que o sistema imunológico (as defesas naturais do corpo) produza anticorpos e glóbulos brancos especializados que atuam contra o vírus, dando proteção contra o COVID-19. Nenhum dos ingredientes desta vacina pode causar COVID-19.

-QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser usado se você é alérgico à substância ativa ou a qualquer um dos outros componentes desta vacina (listados na seção “COMPOSIÇÃO”)



-O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de lhe ser administrada a vacina covid-19 (recombinante) se:

- você já teve uma reação alérgica grave após a injeção de qualquer outra vacina; • você já desmaiou após receber qualquer injeção;
- você está com uma infecção grave com temperatura elevada (acima de 38 °C). No entanto, você pode ser vacinado se tiver febre baixa ou infecção das vias respiratórias superiores, como um resfriado
- você tem problemas de hemorragia ou hematomas, ou se está tomando um medicamento anticoagulante (para prevenir coágulos sanguíneos)
- o seu sistema imunológico não funciona corretamente (imunodeficiência) ou está tomando medicamentos que enfraqueçam o sistema imunológico (como corticosteroides em altas doses, imunossupressores ou medicamentos para câncer).

Como acontece com qualquer vacina, a vacinação com a vacina covid-19 (recombinante) pode não proteger totalmente todos aqueles que a recebem. Não se sabe por quanto tempo você estará protegido.

Distúrbios do sangue: Uma combinação de coágulos sanguíneos e baixo nível de “plaquetas” (células que ajudam seu sangue a coagular) no sangue foi observada muito raramente após a vacinação com a vacina covid-19 (recombinante). O evento inclui casos severos de coágulos sanguíneos, incluindo em locais incomuns, como no cérebro, fígado, intestino e baço, em alguns casos em combinação com sangramento. Esses casos ocorreram dentro das 3 primeiras semanas após a vacinação, e ocorreram, na maioria, das vezes em mulheres abaixo de 60 anos de idade. Desfecho fatal foi reportado. Procure atendimento médico imediato se sentir dores de cabeça fortes ou persistentes, convulsões, alterações do estado mental ou visão turva, hematomas inexplicáveis fora do local da vacinação que aparecem alguns dias após a vacinação, pequenas manchas arredondadas na pele fora do local da vacinação, desenvolver falta de ar, dor no peito, dor nas pernas, inchaço nas pernas ou dor abdominal persistente. Informe o seu médico que você recebeu recentemente a vacina covid-19 (recombinante).



Crianças e adolescentes: A vacina covid-19 (recombinante) não é recomendada para crianças com menos de 18 anos. Atualmente, não há informação suficiente disponível sobre o uso da vacina covid-19 (recombinante) em crianças e adolescentes com menos de 18 anos de idade.

Outros medicamentos e a vacina covid-19 (recombinante): Informe o seu médico ou farmacêutico se você tomou, está tomando ou pode vir a tomar medicamentos ou vacinas. **Gravidez e amamentação:** Se você está grávida ou amamentando, se acredita que pode estar grávida ou planeja engravidar, consulte o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de receber esta vacina.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas Alguns dos efeitos secundários da vacina covid-19 (recombinante) listados na secção.

-QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Podem afetar temporariamente a sua capacidade de conduzir ou utilizar máquinas. Espere até que esses efeitos desapareçam antes de dirigir ou usar máquinas.

Bibliografia: https://www.janssen.com/brasil/sites/www_janssen_com_brazil/files/prodfiles/live/vacina_covid-19_recombinante_pub_vp.pdf



4- INSUMOS RECEBIDOS E ADQUIRIDOS PARA VACINAÇÃO COVID-19


Os insumos e materiais utilizados para vacinação da Covid-19 em 2021, fazem parte do estoque já comprado pelo município para o enfrentamento da pandemia. Exceto material cedido pelo Ministério da Saúde (MS). Notas a) e b) escaneadas abaixo.

a) Nota referente a entrega de 400 seringas-SESA/PR

Nota de Entrada de Material - NEM



GOVERNO DO ESTADO - PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR



NEM - NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL

Nº NEM	Nº NEM	Nº Pedido	Data	Movimento				
2450133	8990128	4980823	08/01/2021 08:47:07	AQUISIÇÃO MERCADO NACIONAL				
Entidade Cedente			Endereço	Bairro	Município	UF	CEP	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL			
Entidade Solicitante			Endereço	Bairro	Município	UF	CEP	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR			
NEM emitida por: EDISANDRA FERREIRA LOPES								
Item/Código	Descrição	Unidade	Lote	Fabricante	Validade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1	4** SERINGA ESTERIL DESCART - JML C/AG 20X5,5	UM	0105519	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30/04/2025	400	0,3500	140,00
Total Geral: Itens: 1								
Temperaturas dos insumos no recebimento: POSITIVA 3 NEGATIVA								
Obs: 08								



02450133



b) Insumos recebidos

PM TRÊS BARRAS DO PARANÁ
SMS DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
AVENIDA SÃO PAULO, 001 - CENTRO - TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR
Telefone: (41) 3335-1135

Guia de remessa

Unidade de origem: CASCAVEL - RS19 - CASCAVEL - SCNE
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, ESQ CLÁDIA, 1453 - ALTO ALEGRE, CASCAVEL/PR CxP
Tel: 41 306.0039-12

Unidade de Destino: TRÊS BARRAS DO PARANÁ - SMS DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - Farmácia
Endereço: AVENIDA SÃO PAULO, 001 - CENTRO - TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR CxP
Número da Guia de Remessa: 4290435 Situação: Gerada
Emissão: 18/01/21 00:00 Canceledamento: 18/01/21 12:01 Cancelamento:

Lista de Medicamentos da Guia Remessa

Cod. Med.	Descrição	Medicamento	Fabricante	Lot#	Valor unit.	QTD	Valor Total	QTD	Valor Total	Divergência
1444		Terapêutico (100mg) 200mg Agente (100mg) (100mg)	BRUNO DEBENSON	010000	0,0000	200	0,00	0	0,00	Medicamento não recebido
1445		Terapêutico (100mg) 200mg Agente (100mg) (100mg)	BRUNO DEBENSON	010000	0,0000	400	0,00	0	0,00	Medicamento não recebido
603		Aspirina (100mg) 100mg (100mg)	BRUNO DEBENSON	010000	0,0000	10.000	0,00	0	0,00	Medicamento não recebido
1214		Medicamento (100mg) 100mg (100mg)	BRUNO DEBENSON	010000	0,0000	20	0,00	0	0,00	Medicamento não recebido
2000		Medicamento (100mg) 100mg (100mg)	BRUNO DEBENSON	010000	0,0000	1	0,00	0	0,00	Medicamento não recebido
Valor Total:							0,00		0,00	

Resumo da Guia Remessa

Total de medicamentos na guia de remessa: _____ \$

Total de medicamentos que apresentaram divergências: _____ \$

Ajustado para menor: _____ \$

Ajustado para maior: _____ \$

Não recebido: _____ \$

Assinado por: _____ Emitido por: _____ Recebido por: _____

5- DISQUE DENUNCIA (IRREGULARIDADES E “FURA FILA”)

OUVIDORIA

Assistente social: Jurema Dresch

Telefone: 0800-6452-0705

6- SALAS DE VACINAÇÃO

Local: Sala de vacinação do Centro de Saúde e/ou sala do SENAC (prefeitura)

Endereço: Av. São Paulo nº 449

Horário: 7:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas



7- REGISTRO DE SOBRA IDENTIFICADA DE DOSES DA VACINA

As sobras de vacinas são direcionadas aos profissionais da saúde dos serviços privados mediante preenchimento da DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. Iniciando pelos profissionais das clínicas odontológicas que tenham contato direto com pacientes.

Para tanto, estes profissionais deverão preencher corretamente as Informações no documento DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO com o nome, CPF e função do funcionário que possui contato direto com o paciente. Está declaração deve ser retirada na sala de vacina do Centro de Saúde, Av. São Paulo nº 449. Sendo entregue neste mesmo local após devido preenchimento.

Lembro que os dados preenchidos na declaração citada, são de total responsabilidade do proprietário do serviço de saúde privado.